


# Guide succinct pour l'injection sous-cutanée avec la seringue pré-remplie d'Hepaxane®

Votre médecin vous a prescrit Hepaxane®. Ce guide succinct est destiné à vous aider à effectuer l'injection. Il est important de lire la notice avant de suivre ces informations. Hepaxane® doit être utilisé en respectant strictement les instructions du médecin. Votre médecin détermine la posologie et la durée du traitement.



La seringue préremplie d'Hepaxane® est prête à l'emploi et est à usage unique exclusivement. Après utilisation, jetez la seringue.

## Avant l'injection



- N'utilisez pas la seringue si la date de péremption est dépassée.
- Inspectez la seringue. Évitez d'utiliser la seringue si elle est abîmée ou si la solution à l'intérieur n'est pas limpide.
- **Ne** tentez **pas** de retirer une éventuelle bulle d'air de la seringue avant l'injection.

## Choix et nettoyage du site d'injection



● Sites d'injection abdominale

- Hepaxane® est injecté par voie sous-cutanée profonde (sous la peau). Choisissez une zone sur le côté droit ou gauche de l'abdomen. L'administration doit se faire alternativement par injection sous-cutanée dans la paroi abdominale sur la partie avant ou arrière, du côté droit et du côté gauche.



- Lavez-vous les mains avant l'injection.
- Allongez-vous pour l'injection.
- Nettoyez le site d'injection comme indiqué par votre professionnel de santé.

**HEPAXANE®**

## Réalisation de l'injection



- Sortir la seringue préremplie de la plaquette en décollant le film plastique du blister au niveau de la flèche comme indiqué sur l'emballage. Ne tirez pas sur le piston car cela pourrait endommager la seringue.

Retirez le capuchon protecteur de l'aiguille de la seringue.



- Pincer délicatement la zone nettoyée de l'abdomen entre le pouce et l'index pour former un pli cutané. Vous devez maintenir le pli cutané tout au long du processus d'injection.




- Insérez l'aiguille **perpendiculairement** sur toute sa longueur dans le pli cutané et injectez le médicament en poussant à fond le piston de la seringue.



- Retirez l'aiguille du site d'injection en laissant les doigts sur la tige du piston.
- Pour prévenir les hématomes, il est recommandé de ne pas frotter le site d'injection après l'injection.

## Après l'injection



- Les seringues pré-remplies sont munies d'un dispositif de protection de l'aiguille. Une fois l'injection terminée, tenez le corps de la seringue fermement d'une main. Avec l'autre main, maintenir les ailettes situées à la base de la seringue et tirer jusqu'à entendre un déclic. L'aiguille usagée est maintenant complètement protégée.
- Jetez ensuite la seringue dans un récipient adapté/ résistant à la perforation.

Une fois le traitement terminé, amenez le reliquat de médicament s'il y a avec le reste du contenu à votre médecin ou à votre pharmacien.

Guide à destination des patients et des professionnels - Version Avril 2020 - Vous trouverez des informations plus détaillées dans la notice ainsi que sur la plateforme Swissmedic : [www.swissmedicinfo.ch](http://www.swissmedicinfo.ch).

Titulaire de l'autorisation : EFFIK S.A., Rue du Marché 10, 1260 NYON