

Abgekürzte Fachinformation Fertifol® (Folsäure).

- **Indikationen:** Erhöhter Folsäurebedarf während der Schwangerschaft und Stillzeit.
- **Dosierung:** 1 Tablette täglich vor der Mahlzeit. Einnahme 4 Wochen vor der Empfängnis und 12 Wochen darüber hinaus.
- **Kontraindikationen:** Überempfindlichkeit auf Folsäure, im Falle einer perniziösen Anämie darf Fertifol® nicht allein angewendet werden.
- **Warnhinweise:** Neuraldefekte in der Familienanamnese, megaloblastische Anämie, Glukosetoleranzstörungen, Lapp-Laktase-Mangel, Syndrom einer Glukose-Galaktose-Malabsorption.
- **Interaktionen:** Antiepileptika, orale Kontrazeptiva, Mittel gegen Tuberkulose, Methotrexat.
- **Unerwünschte Wirkungen:** Erythem, Juckreiz, Urtikaria.
- **Packungen:** Packungen zu 28 und 84 Tabletten. Liste D, kassenzulässig.

AUSFÜHRLICHE ANGABEN ENTNEHMEN SIE BITTE DEM
[ARZNEIMITTELKOMPENDIUM DER SCHWEIZ](#).

EFFIK SA, 1260 NYON. Version April 2024