



Que vous inspire l'HPV ?

70 à 80% des femmes
sexuellement actives seront
affectées par le papillomavirus
humain (HPV) au cours de leur vie.

Vous voulez en savoir plus ?



Qu'est-ce que l'HPV ?

L'infection par le papillomavirus humain (HPV) est la **maladie sexuellement transmissible la plus répandue**.

Elle concerne à la fois la peau et les muqueuses, y compris au niveau du col de l'utérus.

Il existe plus de **200 types différents d'HPV**, dont certains ont un potentiel oncogène (capacité à générer des lésions précancéreuses et cancéreuses).

Dans 80 à 90% des cas, les infections sont éliminées par le système immunitaire sans manifestation clinique.

La survenue de lésions ou de cancers du col de l'utérus dépend...

- du **type de virus**. Par exemple, 70% des cas de cancer du col de l'utérus sont causés par les types 16 et 18 d'HPV.
- si vous êtes **vaccinée contre l'HPV**.
- de la force de **votre système immunitaire**. En cas d'immunodéficience, l'HPV ne peut pas être éliminé aussi efficacement.
- de **votre âge**. L'infection par HPV est la plus fréquente chez les jeunes femmes jusqu'à 25 ans.
- de **votre mode de vie sur le plan sexuel**. Seules les personnes sexuellement actives sont infectées par l'HPV.
- de votre **hygiène de vie**. Le **tabagisme** augmentera le risque d'infection à l'HPV persistante et favorisera le développement de lésions du col de l'utérus.
- si vous réalisez **systématiquement des examens de contrôle**. Un dépistage précoce peut réduire le risque de développer un cancer.



Quels sont les symptômes ?

La plupart des personnes infectées par l'HPV ne développent **pas de symptômes**. Dans la plupart des cas, l'infection par l'HPV **disparaît** d'elle-même et ne pose aucun problème.

Comme il s'agit d'une infection asymptomatique, **il est très important de se rendre chez votre gynécologue de manière régulière**. Le médecin effectue des examens simples pour détecter d'éventuelles lésions. Dans la pratique, des examens de suivi sont également effectués et vous serez conseillée à propos d'un éventuel traitement.



Qui peut être contaminé(e) ?

Les infections par l'HPV sont très fréquentes et surviennent indépendamment du sexe. **Presque toutes les personnes sexuellement actives** sont infectées par l'HPV au cours de leur vie.



Comment l'HPV est-il transmis ?

L'HPV peut être transmis par des rapports sexuels oraux, vaginaux et anaux avec une personne porteuse du virus. Les préservatifs peuvent réduire le risque mais ne peuvent pas empêcher complètement la transmission de l'HPV. **Cependant, une infection par HPV n'est pas une raison pour limiter votre vie sexuelle.**



Attention : un test HPV positif ne signifie pas que vous développerez un cancer ; dans la plupart des cas, l'infection guérit d'elle-même.



Comment savoir si je suis infectée par l'HPV ?

L'infection par l'HPV étant asymptomatique, elle ne peut être constatée que par **une visite chez votre gynécologue**.

Les **examens réguliers de détection précoce** sont cruciaux.

Le cancer du col de l'utérus peut être évité si l'infection et/ou les lésions du col de l'utérus sont détectées à un stade précoce.

- **Le test de Pap, appelé frottis du col de l'utérus** aide à détecter la présence de lésions cervicales à un stade très précoce.
- **Le test HPV** en plus de la détection de l'infection indique le type d'HPV.



Comment les lésions dues à l'HPV sont-elles traitées ?

Votre gynécologue vous conseillera sur le traitement le plus approprié en cas de lésions du col de l'utérus.

Il est très important de suivre les conseils et instructions appropriés.



Colpofix® peut être utilisé pour prévenir et traiter les lésions du col de l'utérus provoquées par le papillomavirus humain (HPV).

Voir la notice d'utilisation pour plus d'informations.



Le gel vaginal en spray.

Adhère bien, ne coule pas et régénère le microbiome.

INDICATION

Prévention et traitement des lésions cervicales (lésions du col de l'utérus) provoquées par le papillomavirus humain, grâce au contrôle des conditions physiologiques présentes dans la zone de remaniement de la muqueuse cervico-vaginale.*

APPLICATION HYGIÉNIQUE

Chaque boîte contient un flacon pulvérisateur et 10 applicateurs vaginaux. Les applicateurs sont emballés individuellement dans un emballage protecteur et sont destinés à un usage unique. Changez d'applicateur après chaque utilisation.

APPLICATION

- Une fois par jour, avant le coucher, introduire l'applicateur profondément dans le vagin et pulvériser 5 fois.
- Après utilisation, retirez l'applicateur de la buse et jetez-le dans les déchets résiduels (ordures ménagères).
- 1 boîte suffit pour 10 jours.
- Application pendant 20 jours consécutifs par mois puis 10 jours de pause (pendant les règles).
- Durée d'application : 3 à 6 mois, vous aurez donc besoin, au total, d'au moins 6 boîtes de Colpofix®.
- En cas d'absence de règles ou aménorrhée, vous ne devez pas respecter la pause de 10 jours. La durée d'application est alors de 2 à 4 mois sans pause (minimum 6 boîtes de Colpofix®).

COLPOFIX®

Le gel vaginal en spray.
Adhère bien, ne coule pas et régénère le microbiome.

Nouveau

DISPOSITIF MÉDICAL



Colpofix® est utilisé pour prévenir et traiter les lésions du col de l'utérus provoquées par le papillomavirus humain (HPV).

Application pendant trois mois :

Commencer après les dernières règles (le cas échéant)



Distribution en Suisse: EFFIK S.A., Rue du Marché 10, 1260 Nyon

Fabricant: Uriach Italy, S.r.l. A SOCIO UNICO Assago Milanofiori, Str. 1, Palazzo F6 - 20057 Assago (MI)